

がん薬物療法計画指示書（肺 癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

レジメン名称 CBDCA + VNR 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 年 月 日 ~ 年 月 日

・実施クール（ ）クール目

2. 患者情報 診断名（非小細胞肺癌）

身長 cm 体重 Kg 体表面積 m²

年齢 歳 sCr mg/dL GFR

3. 使用薬剤・投与量

CBDCA 投与量（ ）mg/body = AUC × (GFR+25) ; GFR = $\frac{(140 - \text{Age}) \times \text{体重}}{\text{sCr}(\text{mg/dL}) \times 72}$

女性の場合は体重に 0.85 を掛ける

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①ロセ'ウス静注液 (10mg : 40mg)	25mg/m ²	mg	d. i. v.	生食 50mL
②カルボ'プラチン点滴静注液 (50mg : 150mg : 450mg)	AUC= 5	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day 1 (/)	30min	生食 100mL + パロノセトロン 0.75mg + テ'キサ'ト 6.6mg div.			
	全開で	生食 50mL + ロセ'ウス _____ mg div.			
	全開で	生理食塩液 50mL div. (フラッシュ) ※ロセ'ウス投与終了後、直ちに投与する。(静脈炎予防のため)			
	1hr	5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン _____ mg div. (遮光保存)			
Day 8 (/)	全開で	生理食塩液 50mL div. (プライミング)			
	全開で	生食 50mL + ロセ'ウス _____ mg div.			
	全開で	生理食塩液 50mL div. (フラッシュ) ※ロセ'ウス投与終了後、直ちに投与する。(静脈炎予防のため)			
CBC・生化学検査は投与日の（前日・当日前）					

※ 血管外漏出の場合、冷やすと逆に組織障害が増すという報告もあり、例外としてロセ'ウスの場合、温めたほうが血管を広げ薬剤の吸収を早めるため良いとされています。